

Dezinfekčný plán oddelení s vyšším infekčným rizikom

	ČO?	KEDY?	AKO?	ČIM?	KONC.	EXP.	ÚČINNOSŤ
PLOCHY	podlahy, kľučky, dvere v okolí kľučky, stoly, stolíky, parapety, posteľe, lehátka, vozíky, odpadkové koše, výťahy a pod.	OAIM, JIS: 3 x denne operačná sála: pred a po operačnom výkone ostatné rizikové pracoviská : 2 x denne	pripraveným pracovným roztokom vytrieť na mokro alebo umyť a nechať zaschnúť	INCIDIN RAPID	0,50%	30 min-1hod	A(B)T - ABT
				INCIDIN PLUS	0,5% - 1%	1hod - 30min	A(B)T
	svetlá, steny, dvere	1x týždenne		INCIDIN PRO	0,50%-1,00%	15min	A(B) - A(B)TM
	WC, výlevky, sprchy, vane, umývadlá	2 x denne (vane po použití)		MEDICARINE	1 tbl / 3l vody	30 min	ABTMV
	podložné misy	po použití	mechanicky vyčistiť, opláchnuť, dezinfikovať	MEDICARINE	1 tbl / 3l vody	30 min	ABTMV
	Univerzálne širokospektrálne OXY riešenia s kompletnou materiálovou kompatibilitou	minimálne 1 x denne, respektíve podľa potreby	na plochu nastriekať a nechať zaschnúť, resp. utrieť utierkou	INCIDIN OXYFOAM S INCIDIN OXYWIPE S	sprej / utierky	5 min	A(B)TMV+ Clostridium difficile
	sifóny	minimálne 1 x týždenne	tabletou položiť na mriežku v umývadle preliať vodou do rozpadnutia	MEDICARINE	1 tableta / umývadlo	pri poslednom dennom upratovaní	ABTMV
	epidemiologicky závažná situácia			pracovným roztokom vytrieť na mokro alebo umyť a nechať zaschnúť	MEDICARINE	1 tbl / 1,50l vody	30 min C.diff 10min

Vysvetlivky k mikrobicídemu spektru prípravkov:

- A - usmrtenie vegetatívnych foriem baktérií a mikroskopických kvasinkových húb
- B - plná virucídna účinnosť
- (B) - obmedzená virucídna účinnosť na HBV/HCV/HIV
- C - inaktivácia bakteriálnych spór
- T - usmrtenie M. Tuberculosis
- M - usmrtenie potenciálne patogénnych mykobaktérií
- V - fungicídna účinnosť na mikroskopické vlákňité huby
- z - do zaschnutia

Tabuľka riedenia:

	0,25%	0,50%	1%	1,50%	2%	3%	5%
1 l	2,5 ml	5 ml	10 ml	15 ml	20 ml	30 ml	50 ml
2 l	5 ml	10 ml	20 ml	30 ml	40 ml	60 ml	100 ml
3 l	7,5 ml	15 ml	30 ml	45 ml	60 ml	90 ml	150 ml
5 l	12,5 ml	25 ml	50 ml	75 ml	100 ml	150 ml	250 ml
8 l	20 ml	40 ml	80 ml	120 ml	160 ml	240 ml	400 ml
10 l	25 ml	50 ml	100 ml	150 ml	200 ml	300 ml	500 ml

Poznámky:

PLOCHY

Prípravky určené na dezinfekciu veľkých plôch odporúčame prestriedať v intervale 1-3 mesiace. Rozhodnutie je v kompetencii pracovníka zodpovedného za hyg.-epidemiologický režim v nemocnici.

Plošná dezinfekcia sa zásadne rieši do vlažnej až studenej vody spôsobom prípravkov do vody a nie naopak, kvôli prevencii pred vytvorením prebytočnej peny.

Operačné sály je nutné upratovať na začiatku operačného dňa a po každom pacientovi.

1x týždenne je potrebné vykonať sanitačný deň produktom Medicarine.

Pri striedaní dezinfekčných prípravkov s rozdielnou účinnou látkou je potrebné umyť všetky povrchy neutrálnym detergentom pre odstránenie naakumulovanej vrstvy zložiek dezinfekčných prípravkov.

Túto činnosť vykonávame aj priebežne minimálne raz za týždeň v prípade, že pri striedaní dezinfekčných prípravkov je časový odstup viac ako jeden týždeň

Použitie pracovné pomôcky na upratovanie plôch sa musia po skončení práce dezinfikovať a vysušiť. Mopy sa musia vyprať v biocídnom prac. prostriedku.

Plochy kontaminované biologickým materiálom sa musia prekryť mulom, vatou namočenou v dezinfekčnom prípravku.

NÁSTROJE

Dekontaminácia endoskopov sa musí vykonať podľa odporúčaní výrobcu endoskopu v intenciách odporúčaní endoskopických spoločností (napr. ESGE-ESGENA) a v zmysle Odborného usmernenia č. SOZO - 1410/2000-10

RUKY

Dávkovače Dermados vždy pri výmene náplne dezinfikujeme alkoholovým produktom. Samotnú pumpu ako aj 1ml pumpu na 500ml fľaše je potrebné dezinfikovať v produkte Sekusept Aktiv 2,00%, 15min exp.

- * Postupovať v zmysle vyhlášky 192 z roku 2015.