

	ČO?	KEDY?	AKO?	ČÍM?	KONC.	EXP.	ÚČINNOSŤ	
PLOCHY	podlahy, stoly, stolíky, parapety, posteľe, lehátka, vozíky, odpadkové koše, výtahy a pod.	Oddelenia: 2 x denne Ambulancie : 1 x denne	prípraveným pracovným roztokom vytrieť na mokro alebo umyť a nechať zaschnúť	INCIDIN RAPID	0,25%-0,50% 0,50%	1hod-30 min 1hod	A(B)-A(B)T ABT	
	svetlá, steny, dvere	1x týždenne		INCIDIN OXYDES	1%	15 min	A(B)	
	WC, výlevky, sprchy, vane, umývadlá	2 x denne (vane po použití)		INCIDIN PRO	0,50%	15min	A(B)+Rotavirus	
	podložné misy	po použití	mechanicky vyčistiť, opláchnuť, dezinfikovať	MEDICARINE	1 tbl / 3 l vody	30 min	ABTMV	
	inštrumentárne stolíky, prístroje, rámy postelí, kľučky a dvere v okolí kľučky, hračky	minimálne 1 x denne, respektíve podľa potreby	na plochu nastriekať a nechať zaschnúť, resp. utrieť utierkou	INCIDES N utierky	alkoholové utierky	1 min	A(B)TM	
				INCIDIN LIQUID	neriediť/ koncentrovaný	1 min	A(B)TM	
	INCIDIN PREMIUM WIPES	prístroje , malé plochy: testované produkty - Incidin Pro, Incidin Rapid, Incidin Foam, Incidin Liquid / odporúčané koncentrácie v samostatnom informačnom materiáli						
	Univerzálne širokospektrálne OXY riešenia s kompletnou materiálovou kompatibilitou	minimálne 1 x denne, respektíve podľa potreby	na plochu nastriekať a nechať zaschnúť, resp. utrieť utierkou	INCIDIN OXYFOAM S INCIDIN OXYWIPE S	sprej / utierky	5 min	A(B)TMV+ Clostridium difficile	
	inkubátory, akryl, sklá, lakované povrchy, materiál citlivý na alkohol, prístroje	podľa potreby	na plochu nastriekať penu, rozotrieť a nechať zaschnúť resp. utrieť utierkami	INCIDIN FOAM SANI CLOTH ACTIVE	neriediť/ koncentrovaný	5 min 5min-15min	A(B)TM A(B) ABTM	
	sifóny	minimálne 1 x týždenne	tabletu položiť na mriežku v umývadle preliať vodou do rozpadnutia	MEDICARINE	1 tableta / umývadlo	pri poslednom dennom upratovaní	ABTMV	
epidemiologicky závažná situácia			pracovným roztokom vytrieť na mokro alebo umyť a nechať zaschnúť	MEDICARINE	1 tbl / 1,50l vody	30 min C.diff 10min	ABVMT +Cl.difficile	

Vysvetlivky k mikrobicídnejmu spektru prípravkov:

A - usmrtenie vegetatívnych foriem baktérií a mikroskopických kvasinkových húb

B - plná virucídna účinnosť

(B) - obmedzená virucídna účinnosť na HBV/HCV/HIV

C - inaktivácia bakteriálnych spór

T - usmrtenie M. Tuberculosis

M - usmrtenie potenciálne patogénnych mykobaktérií

V - fungicídna účinnosť na mikroskopické vláknité huby

z - do zaschnutia

Tabuľka riedenia:

	0,25%	0,50%	1%	1,50%	2%	3%	5%
1 l	2,5 ml	5 ml	10 ml	15 ml	20 ml	30 ml	50 ml
2 l	5 ml	10 ml	20 ml	30 ml	40 ml	60 ml	100 ml
3 l	7,5 ml	15 ml	30 ml	45 ml	60 ml	90 ml	150 ml
5 l	12,5 ml	25 ml	50 ml	75 ml	100 ml	150 ml	250 ml
8 l	20 ml	40 ml	80 ml	120 ml	160 ml	240 ml	400 ml
10 l	25 ml	50 ml	100 ml	150 ml	200 ml	300 ml	500 ml

Poznámky:
PLOCHY

Prípravky určené na dezinfekciu veľkých plôch odporúčame prestriedať v intervale 1-3 mesiace. Rozhodnutie je v kompetencii pracovníka zodpovedného za hyg.-epidemiologický režim v nemocnici.

Plošná dezinfekcia sa zásadne riedi do vlažnej až studenej vody spôsobom pripravok do vody a nie naopak, kvôli prevencii pred vytvorením prebytočnej peny.

Operačné sály je nutné upratovať na začiatku operačného dňa a po každom pacientovi.

1x týždenne je potrebné vykonať sanitálny deň produktom Medicarine.

Pri striedaní dezinfekčných prípravkov s rozdielnou účinnou látkou je potrebné umyť všetky povrchy neutrálnym detergentom pre odstránenie naakumulovanej vrstvy zložiek dezinfekčných prípravkov.

Túto činnosť vykonávame aj priebežne minimálne raz za týždeň v prípade, že pri striedaní dezinfekčných prípravkov je časový odstup viac ako jeden týždeň

Použitie pracovné pomôcky na upratovanie plôch sa musia po skončení práce dezinfikovať a vysušiť. Mopy sa musia vyprať v biocídnom pracom prostriedku.

Plochy kontaminované biologickým materiálom sa musia prekryť mulom, vatou namočenou v dezinfekčnom prípravku.

NÁSTROJE
Dekontaminácia endoskopov sa musí vykonať podľa odporúčaní výrobcu endoskopu v intenciách odporúčaní endoskopických spoločností
(napr. ESGE-ESGENA) a v zmysle Odborného usmernenia č. SOZO - 1410/2000-10
RUKY

Dávkovače Dermados vždy pri výmene náplne dezinfikujeme alkoholovým produktom. Samotnú pumpu ako aj 1ml pumpy na 500ml fľaše je potrebné dezinfikovať v produkte Sekusept Aktiv 2,00%, 15min exp.

* Postupovať v zmysle vyhlášky 192 z roku 2015.